
**Eventos adversos e interacciones
medicamentosos en la elección de
fármacos antiarrítmicos para el adulto
mayor**

Grupo IV

Introducción

En el adulto mayor:

- Existe información sobre mayor frecuencia de efectos adversos de los antiarrítmicos.
- La ventana terapéutica es menor
- Es un hecho reconocido la polifarmacia

Ejemplos de Antiarrítmicos

- Amiodarona
 - Torsade de pointes, arritmias ventriculares
 - Hipo e hipertiroidismo
 - Fibrosis pulmonar intersticial
 - Interacciones con anticoagulantes, diuréticos, antibióticos, aumenta QT, fenitoína

Antiarrítmicos

- Diltiazem
 - Falla cardiaca congestiva
 - Bradicardia severa
 - Hipotensión
 - Interactúa con beta-bloqueadores, digoxina y quinidina

Propafenona

- Proarrítmico
- Aumenta niveles de digoxina
- No usar con anticoagulantes, ni antidepresivos

Conclusiones

- **Existe desconocimiento por parte de los médicos de las arritmias así como de las indicaciones e interacciones farmacológicas de los antiarrítmicos**
- **Se sugiere el uso de herramientas que permitan al médico cruzar medicamentos para alertarlo de las interacciones potenciales adversas, incluso las letales**
- **Estar alerta por la coexistencia de alteraciones metabólicas en este grupo de edad, así como las isquémicas**

Gracias por la atención