

Expectativa de vida total y activa como condicionante del control glicémico

Grupo 5

Maribel, Francisco Javier, Orlando, Ernesto, Daniel, José
Andrés

El objetivo del control terapéutico
de la DM se pivota en torno al riesgo
que tiene de desarrollar
micro/macroangiopatía

El tratamiento debe centrarse en el riesgo C-V
total y no sólo en la glucemia

Dificultades en los ancianos

Escasos estudios en ancianos y muy ancianos sobre el impacto del tratamiento

Tablas de riesgo C-V con dificultad se pueden extrapolar a los ancianos

Morbimortalidad competitiva


Antes de tomar una actitud terapéutica, tener en cuenta...

Conocer historia natural de la enfermedad

Conocer tiempo necesario para obtener un beneficio

Conocer existencia de otros FR C-V

Evidencia de daño órgano diana



EDAD: EVT

S. Funcional: EVA

Co-morbilidad / Polifarmacia

PROPUESTA DEL GRUPO

Maximizar la función del paciente



Individualización del tto

**Ancianos con buena
situación funcional, alta
EVA**

Glucemias < 126mg/dl

GPP < 140mg/dl

HbA1c 6.5-7%

FR C-V

Estilos de vida

Educación

**Ancianos con
discapacidad crónica
irreversible**

Glucemias < 200mg/dl

GPP <250 mg/dl

Hb A1c 8-9 %